

(公益社団法人)日本木材保存協会認定薬剤 A-5411

ニッサンラロール乳剤

腐れ・シロアリ対策!

— 保存処理材の加工後又は木材の保護に —

表面塗布用



見えないところに、心を込めて。



兼松サステック株式会社

木材・住建事業部 保存木材営業部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 トルナーレ日本橋浜町6階
TEL (03) 6631-6571 FAX (03) 6631-6579

特 徴

- 低毒性で速効的な防腐防蟻効果を有します。
- 水溶性であるため塗布がしやすい。
- 塗布後のVOCが極めて低くなっています。
- 劇毒物取締法の法的規制を受けない
安全性に優れた製品です。
- 塗布による着色がないため木材本来の質感を残します。

製品情報

- 有効成分 : ヘキサコナゾール(防腐)・・・6%
ジノテフラン(防蟻)・・・・・・・2%
- 使用方法 : 希釈・・・・・・・・水で20倍に希釈する。
標準処理量・・・・塗布、吹きつけ処理 300ml/m²。
- 荷 姿 : 900g×10本(ポリビン)
- 法 規 制 : 消防法・・・第4類第3石油類
劇毒法・・・普通物

注意事項

使用上の注意

1. ラベルに記載されている、使用上の注意をよく読み、用法及び用量を守って使用して下さい。
2. 使用中は、必ず保護具を着用し身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにして下さい。
なお、屋内での使用の際は必ず換気を行って下さい。
3. 使用後は必ず、また薬剤が皮膚に付いたときは直ちに石けんと水でよく洗って下さい。
万一、薬剤が目、口に入った場合には直ちに水でよく洗い流して下さい。作業中に大量の薬剤を浴びた場合には、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、大量の水で付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣類に着替えて下さい。また、必要に応じて医師の診療を受けて下さい。
4. 万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合や、薬剤の使用により、頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐き気、気分が悪くなった場合等には、使用を中止し、清浄な空気の場所で安静にして、直ちに医師の診療を受けて下さい。医師の診療を受ける際には、使用薬剤の名称、成分名(ネオニコチノイド系、アゾール系化合物含有)、症状、暴露状況等についてできるだけ詳細に医師へ告げて下さい。

保管上の注意

1. 使用后、残った薬剤原液は、ラベル表示のある元の容器で密閉し、他のものと区別して保管して下さい。ラベルに記載されている、使用上の注意をよく読み、用法及び用量を守って使用して下さい。
2. 保管場所は、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所で、施錠できる専用倉庫に保管し、関係者以外触れないようにして下さい。使用中は、必ず保護具を着用し身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにして下さい。なお、屋内での使用の際は必ず換気を行って下さい。
3. 購入した薬剤は速やかにお使いになって下さい。